

中華民國急重症護理學會  
113 年急診加護護理師能力鑑定考試試題

考試科目：消化系統及其他之護理

考試時間：45 分鐘

注意事項：(一) 本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者不予計分。  
(二) 本科目共 60 題，須用 2B 鉛筆在答案卡上依題號清楚劃記，否則不予計分。

1. 陳女士 26 歲，因生產後羊水栓塞呈現瀰漫性血管內凝血，下列臨床表徵何者為是？  
a. 心搏過慢、高血壓  
b. 急性腎衰竭  
c. 出現顱內壓增高的症狀，如：意識程度降低  
d. 紫斑、瘀斑等  
① a + b      ② b + c + d      ③ a + b + c + d      ④ a + b + c
2. 當病人輸血後出現乾咳、嚴重的呼吸困難、心跳加速，下列何項處置最適當？  
a. 停止輸血  
b. 採平躺姿勢  
c. 由靜脈給予大量生理食鹽水，取代血製品  
d. 依醫囑給予利尿劑  
① a + c      ② a + b + d      ③ a + d      ④ b + c
3. 病人因肝性腦病變併腦水腫時，下列何種處置 不適合 ？  
① 大量補充 IV      ② Mannitol 治療  
③ 抬高床頭 30 度降低腦壓      ④ 給予 Lactulose 降低氨 (NH<sub>3</sub>) 指數
4. 59 歲丁先生，2 年前發現肝硬化傾向，聽信朋友介紹吃中藥可以治療肝硬化，因全身黃疸、倦怠、食慾不佳、意識昏迷，至急診就醫診斷為猛爆性肝衰竭，肝性腦病變，請問下列照護措施何者正確？  
a. 飲食控制：急性期須限制蛋白質攝取  
b. 可以口服或使用鼻胃管方式給予 Lactulose 每天 2-4 次，每次 30cc  
c. 血漿分離術以增加氨的排出量  
d. 多攝取動物性蛋白質  
① a + b + d      ② b + c      ③ b + c + d      ④ a + b + c
5. 病人在肝硬化晚期時，因循環受影響，會出現下列哪些症狀？  
a. 因動情素分泌過多，會出現硃砂掌  
b. 肝腎症候群  
c. 升糖素 (Glucagon) 上升，致全身血管擴張  
d. 脾臟腫大致紅血球及白血球增加  
① a + b      ② c + d      ③ a + c      ④ b + d
6. 陳小姐 50 歲，C 型肝炎病史，此次因肝衰竭預接受肝移植 (Liver transplantation) 手術，下列何者為其絕對禁忌症？  
① 肝膽系統外非活動性感染      ② 末期心肺疾病  
③ 目前有藥物或酒精濫用      ④ 可控制敗血症及感染
7. 請問下列何項 不是 肝臟移植術後一週常見合併症？  
① 急性排斥      ② 腹內出血      ③ 敗血症      ④ 慢性排斥

8. 2022 年美國腸道與靜脈營養學會 (ASPEN) 對成人重症病人營養支持治療指南中所強調的重點，下列何者正確？
- ①重症病人須視其疾病狀況來決定是否接受營養評估
  - ②重症病人宜及早進食，最好在 24~48 小時內給予腸道營養
  - ③可以依胃殘餘量作為營養消化狀況作為追蹤指標
  - ④建議宜常規使用免疫調節腸道營養配方如 Arginine、Glutamine、DHA、EPA 等來增加病人抵抗力
9. 重症病人在提供腸道營養期間，時有腹瀉情形，臨床上我們處理的方式何種狀況較適當？
- ①停止灌食並尋找原因
  - ②腸道嚴重蠕動不良或可能有腸道缺血風險者應適時補充膳食纖維
  - ③可採用蛋白質分子較小的配方飲食
  - ④可以增加非腸道營養的給予
10. 依據 2019 年 ESPEN 指引-ICU 臨床營養照護，重症患者在 ICU 停留多久應該被認為有營養不良的風險之病人？
- ①只要進 ICU 即是
  - ② 12 小時
  - ③ 24 小時
  - ④超過 48 小時
11. 一位 76 歲女性，因食道靜脈曲張破裂出血入急診，下列緊急處理措施，何者為是？
- a.止血    b.迅速恢復血量    c.置入鼻胃管灌洗    d.矯正低血鉀及代謝性鹼中毒
- ① a+c+d
  - ② a+b+d
  - ③ a+b+c
  - ④b+c+d
12. 關於 Dumping syndrome 的敘述，下列何者為是？
- ①可以分成 Early dumping 與 Late dumping
  - ②Early dumping 會出現低血壓及 Tachycardia
  - ③Late dumping 會出現高血糖的症狀
  - ④三餐進食正常
13. 胃癌手術後容易出現傾食症候群 (Dumping syndrome)，其原因與下列何者無關？
- ①幽門功能喪失
  - ②胃儲存能力喪失
  - ③低滲透壓的食物快速流入小腸
  - ④常見於 Billroth II 重建術後
14. 林先生肝腫瘤術後入住加護病房，腹部 Hemovac 引流管留置，術後第二天引流液呈現墨綠液體，可能是什麼原因？
- ① Normal
  - ② Infection
  - ③ Leakage
  - ④ Bleeding
15. 周女士 60 歲，主訴左上腹疼痛，疼痛輻射至背後，周女士可能是什麼腹部急症？
- ①急性胰臟炎
  - ②急性膽囊炎
  - ③急性闌尾炎
  - ④急性腹膜炎
16. 有關急性腹膜炎 (Acute Peritonitis)，下列何者錯誤？
- ①通常會出現皮下藍紫斑，若出現在臍部時稱為庫倫式徵象 (Cullen sign)
  - ②最主要症狀是腹痛
  - ③壓痛、反彈痛是腹膜炎的主要表徵
  - ④通常伴有明顯腹脹

17. 肝昏迷病人發生潛在急性混亂時，下列護理措施何者為是？  
 a.密切監測血中尿素氮  
 b.使用鎮靜劑  
 c.依醫囑給予 Lactulose 並觀察腹瀉之副作用  
 d.每四小時監測病人意識狀態  
 ① a + c + d      ② a + b + d      ③ b + d      ④ c + d
18. 小東於妊娠 26 週又 2 天出生，有關他生理特徵之敘述，下列哪一項**錯誤**？  
 ①腳跟光滑無皺褶，僅腳底前部有些許皺褶  
 ②反射較弱，缺乏尋乳、吸吮及踏步反射  
 ③肌肉張力弱，手腕彎曲度 $\leq 90$ 度  
 ④皮膚顯較薄且透明
19. 小文 2 個月大，體重 7 公斤，突然出現心跳快速，心電圖顯示狹窄的 QRS 波且速率維持 220~300/min，SPO<sub>2</sub> 維持 90-95%之間，請問立即應執行之處置何者正確？  
 ①立即給予 14 焦耳之電擊      ②給予 Lidocaine 治療  
 ③將冰袋放在小文臉上冰敷      ④進行 CPR
20. 3 個月大小明有心室中膈缺損，因呼吸喘、咳嗽、發燒而住院，動脈氣體分析結果 pH：7.48、PaO<sub>2</sub>：74mmHg、PaCO<sub>2</sub>：30mmHg、HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>：23mEq/L、BE：0，請問目前小明的狀況，下列何者正確？  
 ①呼吸性鹼中毒    ②代謝性酸中毒    ③代謝性鹼中毒    ④呼吸性酸中毒
21. 男童因持續發燒 5 天至醫院求診，醫師診斷為川崎氏症（Kawasaki disease），以下哪一項**不是**川崎氏症診斷標準？  
 ①草莓樣舌      ②頸部淋巴結腫大      ③關節變形      ④眼結膜充血
22. 諸葛小弟 3 個月大，因膽管閉鎖不全住院接受肝門靜脈腸造瘻術，下列處置何者較適合？  
 ①補充高劑量的維生素 A 及維生素 D    ②低鹽飲食及利尿劑，減輕腹水的產生  
 ③給予抗生素預防上行性膽管炎      ④密切觀察漸進性肝硬化的發生
23. 8 歲病童診斷為腦膜炎，請問下列敘述何者**錯誤**？  
 a.大部分的腦膜炎是由病毒感染引起的，又稱病毒性腦膜炎  
 b.身體檢查出現腦膜炎病症，如布魯辛斯基氏徵象（Brudzinski's sign）  
 c.可能出現畏光、攻擊性或全身無力等症狀  
 d.腦膜炎造成顱內壓升高時，應將 PaCO<sub>2</sub> 維持在 40mmHg 以下  
 ① a + b      ② b + c      ③ c + d      ④ a + d
24. 請問下列兒童外傷呼吸道處置，何者為正確？  
 a. 疑似頸椎受傷的兒童以壓額抬頷法，打開呼吸道  
 b. 使用口咽呼吸道（Oral pharyngeal Airway 簡稱：OPA），以反向放入，碰觸到咽部後再轉 180 度到正向位置，使凸起端在嘴唇上  
 c. 插管時，小於 8 歲的兒童使用無氣囊之氣管內管  
 d. 頭部損傷的兒童插管前，可考慮先給予 Lidocaine，以避免顱內壓上升  
 ① a + b    ② b + c    ③ c + d    ④ a + b + c + d

25. 8 個月大病嬰，玩耍時不慎由床上跌落，頭部受傷出現血腫故至急診，護理師依據兒童適用之昏迷量表（Glasgow coma scale; GCS）評估其意識狀態，予手部疼痛刺激時，眼睛會睜開、手部回縮、且躁動不安無法安撫，請問其昏迷指數是幾分？  
①14 分      ②8 分      ③4 分      ④10 分
26. 下列何者為體溫過低（Hypothermia）可能引發之效應？  
①血中 Epinephrine 濃度降低      ②減少血液粘度 Viscosity  
③氧氣-血紅素解離曲線向右移動      ④可以觀察到心電圖 Nonspecific ST-T changes
27. 21 歲男病人，於工作時不慎打翻鹼性粉狀化學物質，灑落雙手臂且感覺皮膚深處刺痛感，119 送至醫院時，病人主訴雙手臂疼痛且感覺麻麻，請問應如何處理？  
①以大量清水沖洗 10 分鐘      ②用冰水直接浸泡  
③以乾紗布或棉棒移除粉狀化學物質      ④提供酸性中和劑藥膏塗擦
28. 一位 32 歲女性，穿越馬路時被汽車撞及腹部，倒地不起，血壓 82/46 mmHg，心跳 132 次/分鐘，呼吸 24 次/分鐘，腹部超音波檢查有內出血症狀，X 光發現骨盆腔骨折，下列敘述何者最適當？  
①骨盆腔骨折致後腹腔動脈出血發生機率最低，但最致命  
②骨盆腔骨折出血量最高可達 1500-2000 cc  
③常用升壓劑改善其低血壓及休克症狀  
④骨盆腔骨折常屬低能量撞擊所致，較少合併其他外傷
29. 下列診斷何者可能影響換氣功能且有立即威脅生命的風險？  
a.張力性氣胸    b.心包填塞    c.肺挫傷合併單純性肋骨骨折    d.肺挫傷合併連枷胸  
① a + b + c      ② a + c + d      ③ a + b + d      ④ b + c + d
30. 50 歲男性，因車禍撞擊導致連枷胸，下列敘述何者正確？  
a.第 4-10 肋骨最易發生骨折      b.常伴有嚴重的呼吸窘迫  
c.奇異性呼吸是指吸氣時胸部斷裂處向外凸出，呼氣時內凹      d.常合併氣血胸  
① a + b + c      ② b + c + d      ③ a + b + d      ④ a + c + d
31. 9 歲林小妹，阿嬤騎機車載其上學途中發生車禍，救護車送入急診室，身體評估時其臉色蒼白，左上腹疼痛，於呼吸時可加劇，按壓腹部時出現眉頭深鎖身體內縮，請問病人可能出現下列何種狀況？  
①腎臟創傷      ②脾臟創傷      ③肝臟創傷      ④腸胃道創傷
32. 王先生 65 歲，在田地工作不慎遭雷擊，電燒傷對身體之傷害，下列敘述何者正確？  
①直流電造成的傷害較嚴重      ②阻力愈大的組織傷害愈嚴重  
③受傷程度可從皮膚外觀評估      ④血管與神經的損傷最為嚴重
33. 王先生為某大學一年級學生，與同學騎機車夜遊發生交通意外，重大外傷送至醫院治療，目前已呈現腦死，經醫師充分說明、家屬討論後，決定器官捐贈以遺愛人間，請問是符合下列何者醫學倫理原則？  
a. 自主原則      b. 行善原則      c. 正義原則      d. 不傷害原則  
①a + b      ② b + c      ③ c + d      ④ a + c

34. 王先生爬山時，不慎被蛇咬傷，下列處置何者正確？
- 在傷口附近做標記，並在給血清前，每 15 分鐘測量傷口腫脹情形
  - 可給予廣效抗生素，以免蛇口腔之細菌感染
  - 無法分辨何種蛇毒時，應注射神經性蛇毒血清，以減少過敏反應
  - 給予注射破傷風免疫球蛋白，以預防破傷風
- ① a + b + c      ② a + c + d      ③ b + c + d      ④ a + b + d
35. 有一位 56 歲女性吃了真空包裝豆干幾小時後，持續嘔吐、下肢無力，至急診就醫，病人有視力模糊、口齒不清、臉部僵硬，且出現呼吸困難，經評估後可能是肉毒桿菌中毒，請問下列處置何者正確？
- 給予催吐
  - 須先採取病人血液檢體 40 mL 送驗
  - 給予氣管插管
  - 盡速向疾管署申請肉毒桿菌抗毒素治療
- ① a + b + c      ② a + b + d      ③ b + c + d      ④ a + b + c + d
36. 有關藥物濫用的嚴重性敘述，下列何者正確？
- 安非他命會產生破壞性與攻擊性行為，以及精神症狀的改變
  - BZD 藥物濫用後，雖會產生欣快感，但不會產生心理依賴
  - FM2 [ Flunitrazepam (Rohypnol®) ] 使用後會產生放鬆愉悅感，長期使用不會有耐藥性
  - 大麻濫用後不會產生心理依賴與耐受性
37. 台灣五級檢傷與急迫度量表經判定為二級者，建議再評估時間？
- ① 立即      ② 10 分鐘      ③ 30 分鐘      ④ 60 分鐘
38. 有關大量傷患事故檢傷分類 START (Simple Triage and Rapid Treatment) 之敘述，下列何者**錯誤**？
- 救難現場的救治順序依檢傷分類為四級，且以顏色區分
  - 若無脈搏或橈動脈微弱、末梢血流回充>2 秒者，則繫上紅色牌子為第一優先處理
  - 若可自行行走者，則繫上黃色牌子為第三優先處理
  - 評估意識時若傷患無法聽指令者，則繫上紅色牌子為第一優先處理
39. 下列何者符合安寧緩和醫療條例中明訂「不施行心肺復甦術 (Do-Not-Resuscitate, DNR)」的情況？
- 意願人不得以預立醫療代理人的方式，選擇 DNR
  - 意願人得以口頭表示 DNR 之意願，不需簽署意願書
  - 應有二位專科醫師診斷為末期病人
  - 應有三位專科醫師診斷為末期病人
40. 有關重症單位「猴痘」病人照護，下列敘述何者為是？
- 感染管制措施應執行至患者皮膚病灶結痂為止
  - 穿戴手套可以取代濕洗手或酒精性乾洗手
  - 於病室門口標示病人需要採取飛沫及接觸隔離防護措施
  - 避免環境中灰塵或病灶脫落的結痂揚起，建議採取濕式清潔消毒方式
- ① a + b      ② b + c      ③ c + d      ④ a + c

41. 一位車禍創傷導致下肢出血壞死的國中生個案，加護病房會客時，主治醫師向家屬解釋有截肢的可能，家屬情緒激動頻要求更換醫師、轉院治療、治不好就要告醫師…。面對可能爆發的申訴或醫療糾紛，下列敘述何者正確？
- ① 醫療糾紛並不一定有醫療疏失，溝通不良常常是醫療糾紛的原因
  - ② 請醫師繼續給予解釋病情，不需通報醫療糾紛的事件
  - ③ 家屬抱怨時，予回覆「會向上報告，由院方處理」
  - ④ 通報臺灣病人安全通報系統 (Taiwan patient safety reporting system, TPR)
42. 68 歲吳女士，10 年前體檢時發現 B 型肝炎，從未追蹤，3 個月前因易疲倦至醫院檢查為肝硬化，今日全身黃疸、腹脹及下肢水腫，意識不清至急診就醫，診斷為肝昏迷。請問下列護理重點的敘述何者正確？
- a. 預防便秘造成氨在體內累積故須使用瀉劑
  - b. 禁用排鉀性利尿劑、鎮靜劑
  - c. 使用抗生素，每日口服 4-6g Neomycin 以減少腸道細菌
  - d. 急性期不須限制蛋白質飲食攝取，恢復期可採高蛋白質飲食
- ① a+b+c      ② a+c+d      ③ a+b+d      ④ b+c+d
43. 李小姐，22 歲，60 公斤，因單純腹部穿刺傷導致出血，請問出血量 500ml 時，屬於出血量第幾級？
- ① 第一級      ② 第二級      ③ 第三級      ④ 第四級
44. 王先生，60 歲，有喝酒習慣，兩年前因腹脹，疲倦診斷酒精性肝硬化，因近日感全身不適至急診就醫，請問下列肝硬化的臨床表徵，何者為正確？
- a. 腹水      b. 尿量少      c. 低蛋白血症      d. 高鉀血症
- ① a+b+d      ② a+b+c      ③ a+c+d      ④ a+b+c+d
45. 50 歲張先生為猛爆性肝衰竭個案，關於肝移植術後的照護措施，下列何者為是？
- a. 維持病人血液動力學穩定
  - b. 多進食高蛋白飲食
  - c. 體溫升高、脈搏變慢、呼吸變深且慢，可能出現排斥現象，須立即通知醫師
  - d. 術後需食用全熟食物
- ① a+b      ② b+c+d      ③ a+b+c+d      ④ a+b+d
46. 有關腹部腔室症候群 (Abdominal Compartment Syndrome)，下列何者**錯誤**？
- ① 腹部創傷病人，會因腹內出血、腸麻痺、脹氣或大量輸液而造成腹內臟器腫脹
  - ② 腹內臟器腫脹，會引起腹內壓力上升
  - ③ 腹內壓力上升，會壓迫橫膈膜與肺臟，造成呼吸困難，且因靜脈回流心臟血液也會減少，導致血壓下降
  - ④ 腹部創傷病人血壓低時，應持續給予大量輸液，以避免休克
47. 嬰兒上呼吸道阻塞之急救方式，下列敘述何者**錯誤**？
- ① 先將嬰兒以雙手固定頭頸部，放置大腿上
  - ② 擺成頭下腳上姿勢
  - ③ 拍背五下，壓胸五下，口中看見異物，挖出再吹，否則直接吹
  - ④ 若吹不進氣，則持續嘗試挖出異物，直到吹進氣為止

48. 有關兒童腦膜炎之描述及照護，下列何者**錯誤**？
- ①腦膜炎是兒童中樞神經感染中最為常見的一種，主要是由病毒或細菌感染導致
  - ②3~12歲兒童症狀常有發燒、劇烈頭痛、畏光、嘔吐、頸部僵硬、後頸疼痛、甚至精神活力變差等症狀
  - ③除了臨床症狀及理學檢查外，最重要是施行腰椎穿刺取得腦脊髓液的分析及培養，來判別為病毒或細菌感染導致
  - ④細菌性腦膜炎，腦脊髓液中的葡萄糖濃度會上升，蛋白質濃度會下降
49. 外傷出血處置的敘述，下列何者為是？
- ①創傷死亡三角是指低血壓，低血氧與低體溫
  - ②主動脈復甦性血管球囊閉合術（Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta, REBOA）不適用於胸腔疑似出血或心臟驟停之患者
  - ③依照外傷處置指引建置大口徑靜脈管路
  - ④輸液與輸血補充應採血漿：血小板：紅血球 = 1:1:2
50. 30歲張先生，因燒傷被送入急診室，護理師為其做身體檢查評估，發現其後胸的二分之一面積及整個右臂均為二度及三度燒傷，依九分定律估計，其燒傷面積為多少？
- ①9%      ②13.5%      ③18%      ④21.5%
51. 有關兒童與成人檢傷的差異，以下何者為是？
- ①解剖，生理評估及調節變數原則相同
  - ②兒童主訴，臨床表現和成人相同
  - ③兒童快速視診依據兒童評估三角方法（PAT），非 ABCD
  - ④兒童或家長主訴之症狀，即可能為真正病情
52. 若您是急診室護理師，下列哪一位病人要列為最優先處理？
- ①50歲男性中風症狀（突發性口齒不清/單側肢體感覺異常）症狀發作時間>6小時
  - ②75歲女性，滑倒，主訴右髖部疼痛，但沒有撞到頭，右腳明顯變短且外轉，足背動脈摸的到，生命徵象正常，意識清楚，疼痛程度 8/10
  - ③74歲男性，血尿兩天，現因無法排尿至急診，感覺下腹漲痛不適，疼痛程度 8/10，T：37°C，P：112次/min，R：20次/min，BP：157/108mmHg，SpO<sub>2</sub>：99%
  - ④4歲小孩在家裡發生抽搐，父母親說這樣的情況已經發生過3次，都和發燒有關；小朋友是在睡覺時發燒，接著出現了近一分鐘的抽搐，型態和過去一樣，在檢傷時看起來無病容、可對話。T：39°C，P：100次/min，R：24次/min
53. 高小姐由家屬送入急診，家屬代訴因與友人吵架後心情不好，自行服用藥物，不清楚藥名及服用數量。測量高小姐瞳孔有縮小情形，判斷其服用的藥物最可能為何？
- a.中樞神經抑制劑，如：嗎啡、鴉片類      b.乙醯膽鹼藥物，如：Pilocarpine  
c.擬交感神經藥物，如：Amphetamines      d.抗乙醯膽鹼藥物，如：抗組織胺
- ①a+b      ②a+c      ③b+c      ④b+d
54. 醫療事故預防及爭議處理（以下簡稱醫預法），113年1月1日正式實施。醫預法等三大原則，下列何者**錯誤**？
- ①即時關懷      ②調解先行      ③事故預防      ④保障醫療工作者權益

55. SARS-CoV 2 病毒因其病毒特性無法阻絕根除，下列有關 SARS-CoV 2 病毒特性之敘述，何者**錯誤**？
- ① 傳播力大於流感
  - ② 出現症狀前即可傳播，且初期病毒量高
  - ③ 免疫力持久，短期內不易重複感染
  - ④ RNA 病毒加上大量傳播容易變異，變異後形成免疫逃脫
56. 李先生，因車禍造成肝臟撕裂傷、大量急性出血及休克，醫囑開立緊急全血（Whole blood, WB）輸血，請問輸血過程中之注意事項，下列何者為是？
- a. 輸血之管路可同時輸葡萄糖鈣以預防低血鈣症
  - b. 應使用較粗針頭輸血（18-20 號）
  - c. 輸血前後應使用 0.9% 生理食鹽水沖洗管道
  - d. 因緊急輸血，故血液出庫後可用熱水加熱，以利盡快輸入病人體內
- ① a + b      ② b + c      ③ c + d      ④ a + b + d
57. 女性 46 歲病人，無特殊疾病史，周日與子女聚餐慶祝母親節，點了最愛吃的粿仔條，回家半夜開始腹瀉，因脫水嚴重，經檢驗為邦克烈酸（Bongkrelic acid, BGC）中毒，請問邦克烈酸中毒之反應特性，下列何者**錯誤**？
- ① 快速產生腸胃道症狀，噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛數小時
  - ② 一至數天內快速進展至器官衰竭，包括肝腎嚴重 Lactic acidosis
  - ③ 病人有嚴重代謝性鹼中毒
  - ④ 暴露過風險食物如 Rice noodles
58. 常見急重症病人之營養支持方式，下列何者正確？
- ① 優先考慮腸道外營養支持
  - ② 考量靜脈營養管路建立不易，應可與大量點滴及抗生素等共用同一靜脈管路
  - ③ 營養評估方法可藉由病人的體位測量、臨床檢查、檢驗數據及飲食攝取等四個方向來進行
  - ④ 臥床病人，灌食時，至少將床頭抬高 75° 以上，以預防吸入性肺炎
59. 在老年外傷患者的處理中，以下哪項是正確的？
- ① 老年人若有腦硬膜下出血，症狀是容易發現的
  - ② 老年人因骨質疏鬆，肋骨為最常發生骨折之部位
  - ③ 老年人更容易出現休克的症狀
  - ④ 跌倒是最常見的受傷機轉之一
60. 一位個案被帶至急診時，出現大量出汗、呼吸快速、抱怨心悸頭暈，檢查後排除心血管疾病，初步診斷為急性焦慮反應，下列敘述何者正確？
- a. 緩解個案過度換氣，可讓個案對一只空紙袋呼吸
  - b. 照顧護理診斷為焦慮個案時，主要目標為減少個案焦慮程度
  - c. 服用抗焦慮藥物可能出現錐體外徑症候群，應給予衛教，宜謹慎使用
  - d. 個案抱怨不安時，對談應說些樂觀的話
- ① a + b      ② a + b + c      ③ a + c + d      ④ a + b + c + d